

دانشور

پزشکی

مقایسه تأثیر پشه‌بندهای پاره آغشته به حشره‌کش‌های لمبدا سی‌هالوترین، بای‌فنترین و دورکننده DEET روی خوځواری آنوفل استفنسی (دوبالان): کولیدسیده) ناقل اصلی مالاریا در ایران

نویسندگان: محمد دهکی^۱، دکتر عزت‌الدین جوادیان^۲،
دکتر حسن وطن‌دوست^۳ و محمدرضا عبائی^۴

۱. کارشناس ارشد گروه حشره‌شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 ۲. استاد گروه حشره‌شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ۳. دانشیار گروه حشره‌شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ۴. مربی گروه حشره‌شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
- * نویسنده مسئول:
Email: hvatandoost@yahoo.com

چکیده

مقدمه: کنترل ناقلین مالاریا یکی از مهم‌ترین راهبردهای جهانی برای پیشگیری از این بیماری است. اهداف: کارایی پشه‌بندهای آغشته به حشره‌کش‌های لمبدا سی‌هالوترین ۲/۵ درصد و CS و بای‌فنترین ۷/۸ درصد از خوځواری و TALSTAR®80g/LSC و همچنین دورکننده دیت (DEET) با سه غلظت مختلف از هر کدام در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: آزمایش‌ها با استفاده از سوش هند آنوفل استفنسی و تمایل آن‌ها به عبور از سوراخ‌های موجود در توری‌های آغشته انجام گرفت. شاخص‌های مرگ و میر، مانعت از خوځواری و اندکس ورودی پشه‌ها به روش استاندارد تست تونل با طعمه حیوانی (خوکچه هندی) محاسبه گردید. میزان مرگ و میر در پشه‌بند پاره غیرآغشته (شاهد) پس از ۱۵ ساعت، ۴-۱ درصد بود که عمدتاً به علت مدفوع و ادرار خوکچه هندی بود. تعداد پشه‌هایی که عبور از سوراخ‌های پشه‌بند شدند ۹۶-۹۷ درصد بود که ۹۵ درصد هم موفق به خوځواری شدند.

نتایج: هنگامی که از پشه‌بند آغشته به بای‌فنترین در سه دوز ۳/۱۲۵، ۶/۲۵ و ۲۵ میلی‌گرم در مترمربع استفاده شد، میزان مرگ و میر به ترتیب ۹۴/۵، ۹۵/۵ و ۹۶/۵ درصد بود. تعداد پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌های پشه‌بند شدند، در دوزهای بالا به ترتیب ۳، ۷ و ۱۲ درصد بود و میزان مانعت از خوځواری به ترتیب ۱۰۰، ۱۰۰ و ۹۷ درصد به دست آمد. هنگامی که از پشه‌بند آغشته به لمبدا سی‌هالوترین در دوزهای ۲/۵، ۵ و ۲۰ میلی‌گرم بر مترمربع استفاده شد، تعداد پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌ها شدند به ترتیب ۷۱/۵، ۱۲/۵ و ۵ درصد و درصد مرگ و میر نیز به ترتیب ۴۵/۵، ۸۸ و ۹۷ درصد بود. همچنین درصد مانعت از خوځواری به ترتیب ۳۸، ۹۷/۵ و ۱۰۰ درصد به دست آمد. هنگامی که از پشه‌بندهای آغشته به دورکننده دیت در دوزهای ۲/۵، ۵ و ۲۰ گرم بر مترمربع استفاده شد، نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر پشه‌ها به ترتیب ۹۱/۵، ۸۶/۵ و ۹۲/۵ درصد است. درصد پشه‌های ورودی و مانعت از خوځواری نیز به ترتیب ۲۸/۵، ۲۵ و ۷ درصد و ۹۳/۵، ۹۷/۵ و ۱۰۰ درصد برآورد گردید. بحث: نتایج نشان می‌دهد که بای‌فنترین و دورکننده دیت حتی در کمترین غلظت می‌توانند مرگ و میر بالایی داشته باشند و افزایش غلظت این سموم در شاخص‌های مورد مطالعه تأثیر چندانی نداشت. لذا استفاده از این حشره‌کش‌ها حتی در پایین‌ترین غلظت‌ها می‌تواند محافظت‌کننده خوبی علیه پشه‌های آنوفل استفنسی، ناقل مهم مالاریا در جنوب کشور باشد.

دوماهنامه علمی
- پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال پانزدهم -
شماره ۷۲
دی ۱۳۸۶

پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌های پشه‌بند شدند ۹۵ درصد هم موفق به خوځواری شدند.

وصول:	۸۳/۱۲/۹
ارسال اصلاحات:	۸۵/۷/۱
دریافت اصلاحات:	۸۵/۷/۱۸
ارسال اصلاحات:	۸۵/۷/۲۹
دریافت اصلاحات:	۸۵/۷/۲۹

داده شد تا خشك شوند. و سايل مورد نياز براي عمل آغشته سازي عبارتند از: سپلر متغیر، سرسپلر، پتري ديش بزرگ، دستگش يك بار مصرف، ليوان، آب معمولي، سم.

تست تونل

تونل تست، اولين بار توسط LIN طراحی و در ادامه کار توسط الیسا و کورتیس (Elissa & Curtis) ارزشیابی شد [۵۱].

با توجه به تغییراتی که در این دستگاه داده شده به شرایط طبیعی نزدیکتر گردیده و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از کلبه های تجربی یکسان هستند [۵۱].

اساس این دستگاه، یک چارچوب مکعب مستطیل از جنس شیشه در ابعاد ۲۵×۲۵ سانتی متر و با طول ۷۵ سانتی متر است. تونل به دو اتاقک تقسیم شده که در محل دو سوم آن، توری آغشته به حشره کش قرار داشت که دارای ۹ سوراخ به قطر یک سانتی متر بود و روی چارچوبی مقوایی نصب گردید [۵۱].

در این تست ها ۱۰۰ پشه ۸-۵ روزه که قبلاً خونخواری نکرده و آب قند آن ها نیز ۱۲ ساعت قبل از آن ها گرفته شده بود، تست گردید. پشه ها در سمت اتاقک بزرگ رها می شدند و یک خوکچه هندی داخل هولدر در سمت دیگر قرار داده می شد (شکل ۱، ۲ و ۳).

بعد از گذشت یک شب (۱۸ تا ۹ صبح) در شرایط محیطی گرم و مرطوب (دماي ۲۸ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۰ درصد) پشه های ماده در دو سمت اتاقک به شرح زیر در هشت حالت توزیع گردیدند:



پشه بند ها در آزمایشگاه مجاور انسکتاریوم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. توری ها ۲۴-۱۲ ساعت قبل از انجام تست، آغشته می شدند و تا یک هفته قابل استفاده بودند. البته در مورد توری های آغشته به دیت آغشته سازی ۴ تا ۵ ساعت قبل از استفاده آن انجام می شد. آزمایش ها در اتاقی با درجه حرارت و رطوبت اپتیمم (حرارت ۲۶±۲ درجه سانتی گراد و رطوبت ۷۰±۱۰ درصد) که نور مکان تست به صورت طبیعی و مصنوعی (مهتابی) تامین می شد، انجام گرفت.

محاسبه مقدار حشره کش

مقدار حشره کش مورد نیاز برای آغشته سازی توری ها، بستگی به مساحت توری، جنس توری و نوع حشره کش دارد. فرمول زیر برای محاسبه مقدار حشره کش مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفت:

$$\frac{\text{Re commended dose}(\text{mg} / \text{m}^2) \times \text{Area of net}}{\text{Concentration of insecticide}(\%) \times 100} \times 1000$$

حشره کش های مورد استفاده در این تحقیق، بای فنترین و لبداسی هالوترین از گروه حشره کش های پیرتروئید و دورکننده دیت بود. دوز های به کار رفته برای آغشته سازی توری ها، برای هر یک از حشره کش ها به این صورت بود که دوز پیشنهادی WHO و همچنین دوز یک چهارم و یک هشتم دوز پیشنهادی استفاده شد. پشه بند مورد استفاده از جنس پلی استر بود، چون برای آغشته سازی آن ها حشره کش کمتری مصرف می شد و سم در سطح پشه بند باقی می ماند و بیشترین اثر را می گذاشت و بنابراین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بودند [۴، ۷، ۱۵ و ۱۶].

محلول سمی مورد نیاز به وسیله سپلر در چندین نقطه روی توری تا شده داخل پتري ديش، اضافه و به مدت سه دقیقه با دست ماساژ داده شد تا آغشته سازی کامل توری انجام گردید. پس از آغشته سازی توری ها، آن ها را در محیط آزمایشگاه و درون هود قرار

یافته‌ها

میزان مرگ و میر در پشه‌بند پاره غیرآغشته (شاهد) پس از ۱۵ ساعت، ۲-۳ درصد بود که عمدتاً به علت مدفوع و ادرار خوکچه هندی بود. تعداد پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌های پشه‌بند شدند ۹۶-۹۷ درصد بود که از این تعداد ۹۶-۹۵ درصد هم موفق به خونخواری شدند.

هنگامی که از پشه‌بند آغشته به بای‌فنترین در سه دوز ۳/۱۲۵، ۶/۲۵ و ۲۵ میلی‌گرم در مترمربع استفاده شد، میزان مرگ و میر به ترتیب ۹۴/۵، ۹۵/۵ و ۹۴/۵ درصد بود. تعداد پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌های پشه‌بند شدند، در دوزهای بالا به ترتیب ۳، ۷ و ۱۲ درصد بود و میزان ممانعت از خونخواری به ترتیب ۱۰۰، ۱۰۰ و ۹۷ درصد به دست آمد.

مقایسه میانگین شاخص ورود در سه غلظت مصرفی حشره‌کش بای‌فنترین و کنترل، اختلاف معناداری را نشان داد ($p < 0/01$). نتایج تست نشان داد که در غلظت ۲۵ میلی‌گرم در مترمربع، میزان شاخص ورود بیش‌تر از غلظت‌های پایین بوده است ($p < 0/01$).

مقایسه میانگین مرگ و میر در سه غلظت حشره‌کش مذکور، اختلاف معناداری را نشان نداد ($p > 0/5$) و در هر سه دوز، اختلاف معناداری با گروه شاهد مشاهده شد ($p < 0/01$). نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش دوز، مرگ و میر تغییری نکرده و با کم‌ترین غلظت، همان مرگ و میر غلظت بالای حشره‌کش حاصل می‌شود.

مقایسه نسبت ممانعت از خونخواری برای حشره‌کش بای‌فنترین نشان داد که بین غلظت پایین و وسط، هیچ اختلافی وجود ندارد ($p > 0/5$)، اما این دو غلظت با غلظت بالا، اختلاف معنادار دارند ($p < 0/01$).

هنگامی که از پشه‌بند آغشته به لمبدا سی‌هالوترین در دوزهای ۲/۵، ۵ و ۲۰ میلی‌گرم بر مترمربع استفاده شد، تعداد پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌ها شدند به ترتیب ۷۱/۵، ۱۲/۵ و ۵ درصد بودند و درصد مرگ و میر نیز به

شکل ۲ نمایی از توری به همراه ۹ سوراخ که روی چارچوب مقوایی نصب شده است.



پ خونخورده در اتاقک بزرگ، پشه‌های مرده و خونخورده در اتاقک کوچک، پشه‌های مرده و خونخورده در اتاقک بزرگ، پشه‌های زنده و خالی (خون نخورده) در اتاقک کوچک، پشه‌های زنده و خالی در اتاقک بزرگ، پشه‌های مرده و خالی در اتاقک کوچک، و بالاخره پشه‌های مرده و خالی در اتاقک بزرگ.

برای ارزشیابی هر حشره‌کش و هر غلظت معین از آن، سه دستگاه همزمان به‌کار برده شد. دو دستگاه به توری آغشته به حشره‌کش و یک دستگاه دیگر به توری غیرآغشته به‌عنوان توری شاهد در نظر گرفته شد. در صورت لزوم، شاخص‌های مورد محاسبه طبق قانون مستقل احتمالات (فرمول آبت) اصلاح می‌گردید.

به‌منظور بررسی اختلاف معنادار، نتایج تست به تفکیک در شاخص‌های مختلف از نرم‌افزار SPSS نخست شاخص‌های مختلف با استفاده از فرمول $\text{Arcsin}\sqrt{p}$ تبدیل شدند و سپس آنالیز واریانس یک‌طرفه (One-Way-ANOVA) استفاده شد. همچنین برای تعیین اینکه کدام گروه با بقیه اختلاف دارد از آزمون حداقل اختلاف معنادار (LSD) استفاده شد. شاخص‌های تصحیح شده با حدود $\alpha = 0/05$ و $\alpha = 0/01$ مورد مقایسه قرار گرفت.

حشره‌کش در مقایسه با شاهد اختلاف معناداري داشتند ($p < 0/01$).

در دوز متوسط نیز اختلاف میانگین نسبت مرگ و میر بین سه حشره‌کش معنادار بود ($p < 0/01$) و فقط بین لمبداسي‌هالوترين و دیت اختلاف معنادار نبود ($p > 0/5$). در دوز متوسط، بیش‌ترین میزان مرگ و میر در بای‌فنتزین مشاهده شد. در دوز بالا نسبت مرگ و میر بین سه حشره‌کش، اختلاف معناداري نشان نداد ($p > 0/5$)؛ ولی هر سه حشره‌کش با گروه اختلاف معنادار داشتند ($p < 0/01$).

مقایسه میانگین شاخص ورود در بین سه حشره‌کش در غلظت پایین نشان داد که اختلاف معناداري بین سه حشره‌کش و همچنین هر سه با گروه شاهد وجود دارد. در غلظت متوسط بین لمبداسي‌هالوترين و بای‌فنتزین، اختلاف معناداري وجود نداشت ($p > 0/5$)؛ ولی بین بقیه و هر سه با شاهد اختلاف معنادار وجود داشت ($p < 0/01$). مقایسه غلظت بالای حشره‌کش‌ها نشان داد که دیت با لمبداسي‌هالوترين و بای‌فنتزین اختلاف معناداري ندارند ($p > 0/5$)؛ اما لمبداسي‌هالوترين با بای‌فنتزین اختلاف معناداري داشت و هر سه با شاهد نیز اختلاف معنادار داشتند ($p < 0/01$).

مقایسه میانگین شاخص مانعیت از خوځواري در بین سه حشره‌کش در غلظت پایین نشان داد که اختلاف معناداري بین سه حشره‌کش وجود دارد ($p < 0/01$). در غلظت متوسط بین لمبداسي‌هالوترين و دیت اختلاف معنادار نبود ($p > 0/5$)، ولی بین لمبداسي‌هالوترين و بای‌فنتزین و دیت اختلاف معنادار بود. در غلظت بالا هم، بین لمبداسي‌هالوترين و دیت اختلاف معنادار نبود، ولی بین لمبداسي‌هالوترين و بای‌فنتزین و دیت اختلاف معنادار بود. همچنین هر سه حشره‌کش با گروه شاهد، اختلاف معناداري داشتند ($p < 0/01$).

ترتیب ۴۵/۵، ۸۸ و ۹۷ درصد بود. همچنین درصد مانعیت از خوځواري به ترتیب ۳۸، ۹۷/۵ و ۱۰۰ درصد گزارش شد.

نتایج نشان داد که میانگین تغییرات دوز حشره‌کش، با تمام شاخص‌ها معنادار است و با افزایش دوز، نسبت مرگ و میر، شاخص ورودی و مانعیت از خوځواري نیز افزایش می‌یابد و هر سه دوز با شاهد اختلاف معنادار داشتند ($p < 0/01$).

هنگامي که از پشه‌بندهاي آغشته به دورکننده دیت در دوزهاي ۲/۵، ۵ و ۲۰ گرم بر مترمربع استفاده شد، نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر پشه‌ها به ترتیب ۹۱/۵، ۸۶/۵ و ۹۲/۵ درصد بود. درصد پشه‌هاي ورودی و مانعیت از خوځواري نیز به ترتیب ۲۸/۵، ۲۵ و ۷ درصد و ۹۳/۵، ۹۷/۵ و ۱۰۰ درصد گزارش گردید.

سه دوز به کار رفته در مورد شاخص ورود نیز بررسی شدند. دو دوز ۲/۵ و ۵ گرم بر مترمربع دیت با هم اختلاف معناداري نداشتند، ولی با دوز ۲۰ گرم بر مترمربع، اختلاف معناداري نشان دادند. هر سه نیز با گروه شاهد اختلاف معناداري نشان دادند ($p < 0/01$).

میانگین میزان مرگ و میر پشه‌ها نیز در سه دوز مقایسه شد. از نظر آماری بین سه دوز به کار رفته اختلاف معناداري در مرگ و میر مشاهده نشد، ولی هر سه دوز با گروه شاهد، اختلاف معناداري نشان دادند ($p < 0/01$).

میانگین میزان مانعیت از خوځواري نیز در سه غلظت به کار رفته مقایسه شد. بین دوز بالا و پایین، اختلاف معنادار بود، ولی بین دوز پایین و وسط و دوز بالا و وسط، اختلاف معناداري مشاهده نشد؛ اما هر سه با شاهد اختلاف معناداري داشتند ($p < 0/01$).

وقتي‌که دو حشره‌کش لمبداسي‌هالوترين، بای‌فنتزین و دورکننده دیت در دوز پایین با هم مقایسه شدند از نظر نسبت مرگ و میر، اختلاف معناداري داشتند؛ ولی بین بای‌فنتزین و دیت اختلاف معناداري مشاهده نشد ($p > 0/5$). با این حال، هر سه

بحث

جستجوی موفقیت‌آمیز ندارند. در این مطالعه مشاهده شد که با افزایش دوز حشره‌کش، نسبت پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌ها شدند، کاهش یافت و این نسبت در حشره‌کش لمبدا سی هالوترین در دوز بالا کم‌تر از بقیه بود؛ اما در مورد حشره‌کش بای‌فنترین مشاهده گردید که شاخص ورود در دوز بالا نسبت به دوز پایین و وسط به مقدار خیلی کم، بیش‌تر شد که علت آن، خاصیت تحریک‌کنندگی و ناک داون کم این سم است.

وقتی تعداد پشه‌هایی که موفق به عبور از سوراخ‌ها می‌شدند، کاهش یابد، متعاقباً نسبت پشه‌های خونخوره نیز پایین می‌آید و محافظت فردی و جمعی پشه‌بند نیز افزایش می‌یابد. در این تحقیق نیز این حالت در بای‌فنترین آشکارتر از بقیه بود. همچنین در دو دوز از حشره‌کش لمبدا سی هالوترین و در هر سه دوز حشره‌کش بای‌فنترین و دورکننده دیت، مرگ و میر قابل ملاحظه‌ای مشاهده شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که برخلاف تصور قبلی، دوزهای پایین نیز می‌توانند مؤثر باشند. همان‌طور که در نتایج آمد، در دوزهای پایین نیز در صد قابل ملاحظه‌ای از خونخواری مشاهده شد. در کل، این تحقیق و مطالعات مشابه [۱، ۲۴ و ۲۵] دیگر نشان می‌دهند که پشه‌بند‌های پاره آغشته به حشره‌کش‌های پیرتروئید و همچنین پشه‌بند‌های آغشته به دورکننده‌ها، مثل دیت اگر در شرایط مناسب نگهداری شوند، می‌توانند محافظ خوبی در برابر آنوفل استنفسی ناقل اصلی مالاریا در کشور باشند.

منابع

1. Hougard, J.M., Duehon, S., Darrirt, F., Zaim, M., Rogier, C., and Guillet, P. Comparative performances, under laboratory conditions, of seven pyrethroid insecticides used for impregnation of mosquito nets. Bull World Health Organ. (2003) 81:324-333.

هوگارد (Hougard) و همکارانش در سال ۲۰۰۳ اثر هفت حشره‌کش پیرتروئیدی را روی آنوفل گامبیه و کولکس کوئینکوفاسیاتوس بررسی کردند. در آن مطالعه، حشره‌کش بای‌فنترین را در دو دوز ۲۵ و ۶/۲۵ میلی‌گرم بر مترمربع و لمبدا سی هالوترین را در دو دوز ۲۰ و ۵ میلی‌گرم بر مترمربع مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آن‌ها نیز حاکی از این بود که میزان مرگ و میر آنوفل گامبیه و کولکس کوئینکوفاسیاتوس با فاصله اطمینان ۹۵ درصد در دو دوز بالا و پایین حشره‌کش بای‌فنترین با هم اختلاف نداشتند و ۱۰۰ و ۹۹ درصد مرگ و میر مشاهده شد. همچنین مانعت از خونخواری در هر دو دوز ۹۷ درصد مشاهده شد (با فاصله اطمینان ۹۵ درصد) که در این تحقیق همین نتایج مشاهده شد. نتایج در پشه‌بند‌های آغشته به لمبدا سی هالوترین در هر دو غلظت بالا و پایین، میزان مرگ و میر یکسان داشته و قابل قبول نیز بود؛ اما برای سوش‌های مقاوم، غیرقابل قبول بود. همچنین میزان مانعت از خونخواری در سوش‌های حساس و مقاوم آنوفل گامبیه در دو غلظت گفته شده، قابل قبول بود و اختلاف زیادی با هم نداشتند. با این حال، در کولکس کوئینکوفاسیاتوس، میزان مانعت از خونخواری در هر دو غلظت بین سوش حساس و مقاوم، اختلاف معنادار داشتند، اما در این تحقیق در دو غلظت ۵ و ۲۰ میلی‌گرم بر مترمربع لمبدا سی هالوترین مشاهده شد که میزان مرگ و میر و مانعت از خونخواری در دو غلظت گفته شده با هم اختلاف معنادار دارند ($p < 0.01$) [۱].

نتیجه‌گیری

پیشگیری از خونخواری پشه‌ها، هدف مهم استفاده از پشه‌بند‌های آغشته به حشره‌کش است که مستقیماً خطر انتقال بیماری را کاهش می‌دهد. وقتی پشه‌بند‌های پاره با حشره‌کش‌ها آغشته می‌شوند، پشه‌ها فرصت کافی برای

12. Carneval, P., Bitsindou, P., Diomande, L., and Robert, V. Insecticide-impregnation can restore the efficiency of torn bed nets and reduce man-vector contact in malaria endemic areas. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 86, (1992) No. 4:362-4.
13. Whelan, P. I. Personal protection from mosquitoes & biting midges in the NT. *Australian Mosquito Control Manual*, Department of Health and Community Services (2004).
14. Yohannes, K., Dulhunty, J.M., Williams, G.M. Malaria control in central Malaita, Solomon Islands. 1. The use of insecticide-impregnated bed nets. *Acta Tropical* (2000) 75, 173-183.
15. Sampath, TR., Yadav, R.S., Sharma, V.P., Adak, T. Evaluation of lambda-cyhalothrin – impregnated bed nets in a malaria endemic area of India. Part 1. Implementation and acceptability of the trial. *J Am Mosq Control Assoc.* 14(1998) No.4: 431-6.
16. Vythilingam, I., Zainal, A.R., Hamidah, T. Laboratory evaluation of lambda-cyhalothrin a microencapsulated formulation on mosquito nets for control of vector mosquitoes. *Southeast Asian J Trop Med Public Health.* 3(1999) 0, No: 1. 177-183.
17. Kemple, M. Protection from mosquito bites. *Journal of Pesticide Reform/ Summer.* 21, (2001) No. 2: 10-12.
18. Mark, S., and Fradin, M.D. Mosquito and mosquito repellent: A clinical guide. *Annals of Internal Medicine.* (1998) 128: 931-940.
19. Reregistration of the Insect Repellent DEET. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs. <http://www.epa.gov/pesticides/citizens/deet.htm>
20. Frances, S.P., Dung, N.V. Field evaluation of repellent formulations against daytime and nighttime biting mosquitoes in a tropical rain forest in northern Australia. *J. Med. Entomol.* 39, (2002) No. 3: 541-544.
21. Hoffman, E.J., Miller, J.R. Reduction of mosquito (Diptera Culicidae) attacks on a human subject by combination of wind and vapor phase DEET repellent. *J. Med. Entomol.* 30, (2002) No. 6: 935-938.
22. D'Alessandro, U., Olaleye, B.O., Guire, W.M., Thomson, M.C., Langerock, P., Bennett, S., and Greenwood, B.M. A comparison of the efficacy of insecticide-treated and untreated bed nets in preventing malaria in Gambian children. *Trans R Soc Trop Med Hyg*, 89, (1995) No.6: 596-8.
23. Takken, W. Do insecticide-treated bed nets have an effect on malaria vectors? *J Trop Med and International Health.* 7, (2002) No. 12: 1022-1030.
2. Hougard, J.M., Duchon, S., Darriert, F., Zaim, M., Rogier, C., and Guillet, P. Bifenthrin: A useful pyrethroid insecticide for treatment of mosquito nets. *J. Med. Entomol.* 39. (2002) No.3: 526-533.
3. Scott, E. Prevention of insect bites in travelers, by using appropriate clothing, insecticide treated bed nets and effective insect repellents. *J Rural and Remote Environmental Health.* 1, (2002) No. 1: 7-9.
4. WHO. Guidelines on the use of insecticide-treated mosquito nets for the prevention and control of malaria in Africa. CTD/ MAL/ AFRO/ 97.4, World Health Organization, Geneva (1997).
5. قليزاده، صابر. بررسی کارایی پشه‌بندهای پاره آغشته به حشره‌کش‌های پیرتروئیدی (سایفلوترین، دلتامترین و پرمترین) روی خویشخواری آنوفل استفنسی (دوبالان: کولیسیده) در شرایط آزمایشگاهی. پایان‌نامه برای دریافت درجه فوق‌لیسانس علوم بهداشتی (MSPH) در رشته حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده پزشکی _ دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۰).
6. Akogbeto, M., Yakoubou, S. Resistance of malaria vectors to pyrethrins used for impregnating mosquito nets in Benin, West Africa. *Bull Soc Pathol Exot.* 92, (1999) No. 2:123-30.
7. WHO. Insecticide-treated mosquito net interventions: A manual for national control program managers. Edited by Roll Back Malaria. World Health Organization, Geneva (2003).
8. Guillet, P., Guessan, R.N., Darriet, F., Traore-Lamizana, M., Chandre, F. and Carnevale, P. Combined pyrethroid and carbamate 'tow in-one' treated mosquito nets: Field efficacy against pyrethroid-resistant *An. gambiae* and *Cx. quinquefasciatus*. *J. Med and Vet. Entomol;* (2001) 15, 105-112.
9. N'Guessan, R., Darriet, F., Doannio, J.M.C., Chandre, F., and Carnevale, P. Olyset Net® efficacy against pyrethroid-resistance of *An. gambiae* and *Cx. quinquefasciatus* after 3 year's field use in Cote d'Ivoire. *J. Med and Vet. Entomol.* (2001) 15, 97-104.
10. Prasittisuk, M., Prasittisuk, C., Pothichiti, V., Aum-aung, B., and Mongklangkul P. The effect of pyrethroid impregnated mosquito nets on field malaria vector populations in experimental huts and individual local houses. *Southeast. Asian. J. Trop. Med. Public Health* 27, (1996) No.3: 610-6.
11. Binka, F.N., and Adongo, P. Acceptability and use of insecticide impregnated bed nets in northern Ghana. *Trop Med Int Health* 2, (1997) No.5: 499-507.

25. Magbity, E.B., Marbiah, N.T., Maude, G., Curtis, C.F., Bradley, D.J., Greenwood, B.M. Effects of community-wide use of lambdacyhalothrin-impregnated bed net on malaria vectors in rural Sierra Leone. *J. Med. and Vet. Entomol.* 11, (1997) No. 1: 79-86.
24. Jawara, M., McBeath, J., Lines, J.D., Pinder, M., Greenwood, B.M. Comparison of bed nets treated with alphacypermethrin, permethrin or lambdacyhalothrin against *Anopheles gambiae* in the Gambia. *Med Vet Entomol.* 12, (1998) No. 1: 60-6.