

دانشور

پژوهشگی

اثر اولئوروپین بر حافظه احترازی غیرفعال در مدل آلزایمر القاشه توسط کلشیسین در موش بزرگ آزمایشگاهی

نویسنده‌گان: سهیلا پور خداداد^{۱*}، مهرنوش مقدسی جهرمی^۱، زهرا خانی‌پور^۱ و منیژه کرمی^۲

۱. مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۲. گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران

E-mail: s.porkhodadad@yahoo.com *نویسنده مسئول: سهیلا پور خداداد

چکیده

مقدمه و هدف: آلزایمر یک بیماری نوروژنریتو گسترده می‌باشد که با اختلال در حافظه و یادگیری همراه است. اولئوروپین یک ترکیب فنولی با اثرات آنتی‌اکسیدانی و نوروپروتکتیو می‌باشد که باعث کاهش استرس اکسیدانتیو و بهبود عملکرد شناختی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات پیش‌درمانی با اولئوروپین بر اختلال شناختی القاشه توسط کلشیسین با استفاده از آزمون اجتنابی غیرفعال می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، از رت‌های ۲۵۰ تا ۲۰۰ گرم استفاده شد. اولئوروپین (۱۰ و ۲۰ mg/kg) به مدت ۱۰ روز به صورت گواژ به موش‌های صحرایی خورانده شد و در روز دهم، ناحیه هیپوکامپ به صورت دو طرفه کانولکداری شد و کلشیسین (۱۵ µg/rat) به داخل ناحیه CA1 هیپوکامپ تزریق گردید. یک هفته بعد، موش‌ها در دستگاه یادگیری اجتنابی غیرفعال آموزش دیدند و تست حافظه ۲۴ ساعت بعد از آموزش به صورت اندازه‌گیری زمان تأخیر ورود به قسمت تاریک شوکده شده و زمان سپری شده در محفله تاریک انجام شد.

دوماهنامه علمی-پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال بیست و سوم-شماره ۱۲۴
شهریور ۱۳۹۵

دربافت: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
آخرین اصلاح‌ها: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
پذیرش: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

نتایج: داده‌ها نشان داد که تزریق مرکزی کلشیسین سبب کاهش زمان تأخیر ورود به قسمت تاریک و افزایش زمان سپری شده در محفله تاریک گردید. تزریق اولئوروپین (۱۰ و ۲۰ mg/kg) پیش از تزریق کلشیسین (۱۵ µg/rat) توانست اختلال شناختی حاصل از کلشیسین را اصلاح کند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تزریق اولئوروپین به صورت گواژ اختلال ایجاد شده در یادگیری و حافظه توسط کلشیسین را بهبود می‌بخشد.

واژگان کلیدی: اولئوروپین، آلزایمر، کلشیسین، حافظه احترازی غیرفعال، هیپوکامپ

مقدمه

حیوانی مناسب برای مطالعه این بیماری ایجاد می‌کند (۱۰-۶).

تمرکز روی رژیم‌های غذایی مؤثر در کاهش خطر آلزایمر در سالمندان می‌تواند برای یافتن مولکول‌های قابل استفاده در پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر سودمند باشد. شواهد زیادی این عقیده را تأیید می‌کنند که رژیم مدیرانه‌ای غنی از پلی‌فنول‌ها که روغن زیتون بخش عمده انرژی مصرفی آن را تشکیل می‌دهد، در پیشگیری از اختلالات مرتبط با سن، سرطان، سکته مغزی، حوادث قلبی‌عروقی، بیماری‌های نوروژنریو و کاهش پاتولوژی بیماری شبه‌آلزایمر و اختلالات شناختی مؤثر می‌باشد (۱۱،۱۲)، به خصوص به نظر می‌رسد که رژیم مدیرانه‌ای مانع از پیشرفت اختلال شناختی متوسط و تبدیل آن به بیماری آلزایمر می‌شود (۱۱). مطالعات زیادی در جوندگان نشان داده‌اند که غذاهای غنی از پلی‌فنول‌ها، به خصوص، روغن زیتون بکر^۲ و آب انگور قرمز اختلال در یادگیری و حافظه وابسته به سن و بیماری را بهبود می‌بخشند و همچنین آسیب اکسیداتیو در مغز را کاهش می‌دهند (۱۳،۱۴).

به‌ویژه تعداد زیادی از پلی‌فنول‌ها و سکوئیریدوئیدها که در روغن زیتون یافت می‌شوند، شامل اولوکانتال، هیدروکسی تیروزول و اولئوروپین است که به طور قوی مسئول اثرات سلامت‌بخشی رژیم مدیرانه‌ای هستند (۱۵). اولئوروپین ماده‌متشكله اصلی برگ و میوه زیتون می‌باشد که دارای اثرات مفیدی از جمله خاصیت آنتی‌اکسیدانی، اثرات ضدالتاهبی، ضدسرطانی و ضدآپوپتوزی می‌باشد (۱۶). گزارش‌ها حاکی از آن است که اولئوروپین عملکرد شناختی را در مدل شبه‌آلزایمری در *C-elegans* و موش‌های TgCRND8 بهبود بخشیده و تجمع آمیلوئید β را کاهش داده است (۱۷،۱۸). همچنین مطالعات زیادی نشان داده‌اند که پیش‌درمانی با اولئوروپین دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی و نوروپروتکتیو در مقابل آسیب ناشی از ایسکمی ریپرفیوژن (۱۹)،

بیماری آلزایمر^۱ یک بیماری نوروژنریو پیچیده و پیشرفت‌ه است که شایع‌ترین شکل دمанс و زوال عقل در دوران پیری می‌باشد و توسط کاهش حافظه و یادگیری، تکلم و دیگر اعمال شناختی شناخته می‌شود و با تخریب سیستم کولینرژیک basal forebrain در سال‌خورده‌ها در ارتباط می‌باشد (۱). پاتوفیزیولوژی AD پیچیده است و با کاهش گسترده تعداد نورون‌های مغز، رسوب پروتئین آمیلوئید بتا (A β) و گسترش پلاک‌های نوروتیک خارج سلولی و ظهور کلاف‌های داخل سلولی فیبریلار همراه می‌باشد که این اختلالات هیپوکمپ و بخش‌های سیستم لیمبیک و کورتکس را درگیر می‌کند (۲،۳). همچنین استرس اکسیداتیو از علل غیرژنتیکی آلزایمر محسوب شده و منجر به ایجاد رادیکال آزاد می‌گردد که امکان تشکیل پلاک را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می‌دهد (۴). از طرفی دیگر، در این بیماری اختلال در عملکرد میکرو‌توبول‌ها باعث وضعیت غیرعادی سیتواسکلتون می‌شود که درنتیجه منجر به اختلال در عملکرد شناختی می‌شود (۴،۵).

مطالعات تجربی بر روی حیوانات نشان داده‌اند که در پی تزریق داخل‌مغزی کلشیسین اختلالاتی مشابه با بیماری آلزایمر از نوع اسپورادیک در یادگیری و حافظه ایجاد می‌گردد (۶). کلشیسین یک آکالالوئید گیاهی است که به جایگاهش روی توبولین متصل می‌شود و ساخت میکرو‌توبول را مختلف می‌کند (۷). این عامل تخریب‌کننده میکرو‌توبول روی شکل و تکامل سلول و عملکرد نورونی از جمله انتقال آکسوبلاسمیک اثر می‌گذارد و همچنین تولید رادیکال آزاد و آسیب اکسیداتیو را افزایش می‌دهد. کلشیسین همچنین عملکرد نورون‌های کولینرژیک را کاهش داده و به عنوان یک مهارکننده قوی فرایندهای رفتاری شناخته شده است که باعث اختلال در عملکرد شناختی می‌شود (۸،۹). بنابراین، تزریق مرکزی کلشیسین یک مدل

². extra virgin olive oil

¹. Alzheimer Disease

یعنی هیپوکامپ با توجه به مختصات اطلس پاکسینوز (AP: -3.8 mm, V: 3 mm, L: ± 1.8 mm) به منظور نصب کانول ایجاد شد. به حیوان تحت مختصات دستگاه داروی موردنظر (کلشی‌سین $15 \mu\text{g}/\text{rat}$) یا حلال کلشی‌سین (سالین $1 \mu\text{l}/\text{rat}$) تزریق شد (۲۴). کانول‌های راهنما ساخته شده از سرسوزن G ۲۱ مطابق مختصات نصب می‌شدند و درحالی‌که حیوان در دستگاه قرار داشت، تزریق دوطرفه کلشی‌سین انجام می‌شد. عمل تزریق به داخل ناحیه هیپوکامپ توسط کانول تزریق که از سرسوزن دندان‌پیشکی G ۲۷ ساخته می‌شد انجام می‌گرفت. دقایقی پس از خاتمه تزریقات داخل‌معزی محل جراحی، ترمیم و بخیه می‌شد. آنگاه پس از به‌هوش آمدن حیوانات جراحی شده و بعد از اطمینان از حصول هوشیاری حیوان، آن‌ها به قفس خود در مرکز نگهداری حیوان منتقل شدند. حیوانات در شرایط استاندارد نگهداری و با آب و غذای کافی تغذیه شدند. اما جهت بررسی خصوصیت نوروپروتکتیو اولئوروبئین، تزریق اولئوروبئین (۲۰، ۱۰ mg/kg/day) یا حلال ۱۰ روز قبل از تزریق کلشی‌سین به صورت گواژه به حیوان انجام می‌شد (۲۶-۲۰).

دوازده روز بعد از تزریق کلشی‌سین، موش‌ها تحت مطالعه رفتاری قرار گرفتند (۲۷). از روش یادگیری اجتنابی غیرفعال^۱ به منظور بررسی یادگیری و حافظه استفاده گردید. دستگاه یادگیری اجتنابی غیرفعال (ساخت ایران، شرکت برج صنعت) از دو بخش تاریک و روشن با ابعاد $30 \times 20 \times 20$ سانتی‌متر تشکیل شده است که توسط یک درب گیوتینی (9×7 سانتی‌متر) از هم جدا می‌شوند. در کف بخش تاریک نیز میله‌های فولادی با فاصله یک سانتی‌متر تعییه شده و به‌وسیله یک کابل ارت Bakan طی به استیمولا تور متصل است و شوک الکتریکی به‌وسیله این میله‌ها به دست و پای حیوان وارد می‌گردد.

یادگیری اجتنابی غیرفعال برای بررسی حافظه موش‌ها در دو روز متوالی انجام گرفت. روز اول، روز آموزش

استرس اکسیداتیو القاشه توسط کلشی‌سین در ناحیه هیپوکمپ مغز (۲۰) و پیری (۱۳) می‌باشد. در مطالعه دیگری دیده شده است که پیش‌درمانی با اولئوروبئین از آسیب اکسیداتیو القاشه توسط ایکسمی در میوکارد جلوگیری می‌کند (۲۱). اگرچه مکانیسم نوروپروتکتیو فنول‌های روغن زیتون به‌طور کامل مشخص نیست، اما به‌نظر می‌رسد که اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی این فنول‌ها، عامل اصلی خصوصیت نوروپروتکتیو آن باشند. الگوهای رفتاری متعددی برای سنجش حافظه و یادگیری در حیوانات آزمایشگاهی وجود دارد. مدل یادگیری اجتنابی غیرفعال به‌طور گسترده در مطالعات فارماکولوژیکی، برای بررسی حافظه طولانی مدت که در ایجاد آن هیپوکمپ یا ساختارهای جانبی مانند استریاتوم نقش دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲۲، ۲۳). در این تحقیق از یادگیری اجتنابی step through غیرفعال ورود به قسمت تاریک استفاده شد. با توجه به شواهد، هدف از این تحقیق، بررسی اثر اولئوروبئین به عنوان آنتی‌اکسیدان پیش از تجویز کلشی‌سین بر فرایندهای حافظه و یادگیری در موش‌های صحرایی با استفاده از تست یادگیری اجتنابی غیرفعال می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در این آزمایش، از رت‌های نر نژاد ویستار با وزن ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم استفاده گردید که در شرایط سیکل تاریکی و روشنی به صورت ۱۲ ساعته در قفس‌های چهارتایی نگهداری شدند. موش‌ها در گروه‌های شش‌تایی قرار داده می‌شد.

گروه‌ها شامل گروه کنترل، گروه کلشی‌سین، گروه کلشی‌سین + اولئوروبئین 10 mg/kg و گروه کلشی‌سین + اولئوروبئین 20 mg/kg بودند.


داروهای استفاده شده در این تحقیق، شامل کلشی‌سین (SDFCL, Indi) کلراال هیدرات (شرکت مرک) و اولئوروبئین (شرکت داناکاسیان) می‌باشند.

به منظور جراحی، ابتدا حیوانات با کلراال هیدرات (400 mg/kg , i.p) بیهوش شدند و با استفاده از دستگاه استرئوتکس جراحی شدند و دو حفره در محل موردنظر

^۱. passive avoidance

یافته‌ها

مقایسه نتایج حاصل از آنالیز واریانس گروه‌ها نشان دادند که ۲۴ ساعت پس از اعمال شوک جهت یادگیری در دستگاه شاتل باکس، تأخیر زمانی برای اولین ورود به قسمت تاریک در موش‌های گروه کلشیسین- سالین، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌داری داشت ($p<0.01$) و همچنین میان گروه کلشیسین- سالین با گروه کلشیسین- اولئوروپین $p<0.001$ (نمودار ۲). مقایسه آنالیز واریانس بین گروه‌ها نیز نشان داد که بین گروه کنترل و کلشیسین- سالین اختلاف معنی‌داری در زمان سپری شده در قسمت تاریک، ۲۴ ساعت بعد از آموزش وجود دارد ($p<0.05$) و این نشان می‌دهد که تخریب هیپوکامپ توسط کلشیسین باعث کاهش در حافظه احترازی غیرفعال می‌شود. همچنین بین گروه کلشیسین- سالین و مقادیر اولئوروپین 10 mg/kg و 20 mg/kg نیز در زمان سپری شده در قسمت تاریک اختلاف معنی‌داری وجود دارد ($p<0.05$) (نمودار ۳). اما مقایسه آنالیز واریانس این گروه‌ها نشان داد در میانگین زمان تأخیر در ورود به قسمت تاریک در ابتدای آموزش (قبل از اعمال شوک)، بین این گروه‌ها اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (نمودار ۱).




نمودار ۱. مقایسه میانگین زمان تأخیر در ورود به قسمت تاریک در ابتدای آموزش (قبل از شوک)

حیوان‌ها در دستگاه بوده و روز دوم، روز آزمون میزان حافظه حیوانات آموزش دیده بود بررسی می‌شد. به این ترتیب که موش را در حالی که پشتش به سمت درب گیوتینی بوده، در داخل اتاق روشن گذاشته شد و ۵ ثانیه بعد، درب گیوتینی باز شده و به حیوان اجازه داده می‌شد وارد بخش تاریک درب گیوتینی بسته شده و حیوان به داخل بخش تاریک درب گیوتینی بسته شده و بعد از ۱۰ ثانیه حیوان به قفس نگهداری برگردانده می‌شد. موش‌هایی که بیشتر از ۱۲۰ ثانیه در ورود به بخش تاریک تأخیر داشته باشند، از ادامه آزمایش حذف می‌گردند. پس از گذشت ۳۰ دقیقه، حیوان دوباره به بخش روشن دستگاه وارد و بعد از ۵ ثانیه درب گیوتینی باز شده تا حیوان وارد بخش تاریک شود. بعد از ورود کامل موش به ناحیه تاریک، به طوری که چهار پای آن وارد محفظه تاریک شود، در بسته شده و شوک الکتریکی با شدت ۰/۵ میلی‌آمپر به مدت ۲ ثانیه به کف پای حیوان اعمال گردید. مدت زمانی که طول می‌کشید تا موش از جعبه روشن به جعبه تاریک برود به عنوان زمان تأخیر در ورود به جعبه تاریک در ابتدای مرحله آموزش (قبل از اعمال شوک) می‌باشد که جهت کنترل توانایی بینایی و حرکتی به کار می‌رفت (۲۹). ۱۰ ثانیه پس از آن، حیوان از اتاق تاریک خارج و در قفس قرار داده شد. به منظور ارزیابی حافظه، ۲۴ ساعت بعد از دریافت شوک الکتریکی، حیوان دوباره در داخل اتاق روشن قرار داده شد و تأخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک ثبت گردید (۷). سقف زمانی در این مرحله، ۳۰۰ ثانیه بود. طولانی تربودن تأخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک، نشانه یادگیری و حافظه بهتر بود. برای آنالیز نتایج مربوط به آزمون یادگیری اجتنابی غیرفعال از آزمون واریانس یک‌طرفه استفاده شد. آزمون LSD به منظور بررسی بیشتر انجام گرفت و $p<0.05$ معنادار تلقی گردید.

بحث


نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که تزریق داخل هیپوکامپی کلشی‌سین (۱۵ μ g/rat) به طور معنی‌داری زمان تأخیر در ورود به اتاق تاریک را کاهش می‌دهد؛ در حالی که مدت زمان حضور در اتاق تاریک را به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش می‌دهد. این نتایج نشان می‌دهد که کلشی‌سین می‌تواند باعث تخریب یادگیری و حافظه اجتنابی غیرفعال شود. این اثرات با نتایج قبلی که تزریق کلشی‌سین به داخل ناحیه CA1 هیپوکamp باعث کاهش حافظه می‌شود، مطابقت دارد (۱۰). همچنین در مطالعه دیگری نشان داده شده است که کلشی‌سین با تخریب میکروتوبول‌ها باعث کاهش یادگیری وابسته به دوز می‌شود (۷). کلشی‌سین به عنوان یک عامل تخریب‌کننده میکروتوبول، کسب یادگیری را از طریق تخریب فعالیت استیبل کولین ترانسفراز قشری کاهش می‌دهد. تزریق مرکزی کلشی‌سین باعث افزایش تولید رادیکال آزاد و استرس اکسیداتیو و درنتیجه اختلال شناختی در حیوانات می‌شود (۹،۸). در حقیقت، تزریق مرکزی کلشی‌سین باعث افزایش نسبت GLU/GABA (۲۸) و تولید NOS در مغز می‌شود و باعث ایجاد استرس اکسیداتیو و آسیب NOS نورونی می‌شود (۳۱-۲۹). نورون‌های حاوی NOS به طور نسبتاً وسیع، در بیماری آلزایمر یافت شده است. در مطالعه حاضر احتمالاً کلشی‌سین باعث تخریب نورون‌های CA1 هیپوکامپ و تخریب سیستم آنزیمی و توبولینی درگیر در انتقالات سیناپسی شده است. تشکیلات هیپوکامپ جزء اصلی سیستم‌های یادگیری مغز می‌باشد که تخریب دوطرفه آن اشکال جدی در حافظه مربوط به حوادث اخیر ایجاد می‌کند.

اولئوروپین ترکیب بیواکتیو اصلی در برگ و میوه فراوری نشده زیتون می‌باشد که دارای اثرات فارماکولوژیکی سودمندی از جمله خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و نوروپروتکتیو می‌باشد (۱۶). مطالعات *in vitro* نشان داده است که عصاره برگ زیتون که ترکیب اصلی آن اولئوروپین می‌باشد، دارای



نمودار ۲. مقایسه میانگین زمان تأخیر در ورود به قسمت تاریک ۲۴ ساعت بعد از آموزش و اعمال شوک (**p<0.01, ***p<0.001), n=6

** اختلاف معنی‌دار بین گروه کنترل با گروه کلشی‌سین - سالین را نشان می‌دهد. *** اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های کلشی‌سین - اولئوروپین با گروه کلشی‌سین - سالین را نشان می‌دهد.



نمودار ۳. مجموع زمان سپری شده در قسمت تاریک ۲۴ ساعت بعد از آموزش (*, #p<0.05), n=6

* اختلاف معنی‌دار بین گروه کنترل با گروه کلشی‌سین - سالین را نشان می‌دهد. # اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های کلشی‌سین - اولئوروپین با گروه کلشی‌سین - سالین را نشان می‌دهد.

می شود (۳۴). اولئوروپین این توانایی را دارد که از فیریلاسیون پروتئین τ در *in vitro* جلوگیری کند (۳۵). اولئوروپین همچنین مانع از تشکیل تجمع امیلوئید β و سیتو توکسیستی آن بهوسیله مهار تشکیل اولیگومرهای سمی می شود (۳۶). در مطالعه دیگری دیده شد که تزریق اولئوروپین به داخل مغز، قادر به کاهش سمیت امیلوئید β و التهاب می باشد (۳۷). همچنین تزریق اولئوروپین پیش از ریپرفیوژن- ایسکمی ناحیه CA1 هیپوکامپ استرس اکسیداتیو ناشی از آن را کاهش داده است (۱۹). محققان نشان داده اند که اولئوروپین همچنین می تواند اختلالات شناختی ناشی از aging را کاهش دهد (۱۳). در مطالعه ای دیگر اولئوروپین آسیب اکسیداتیو در جسم سیاه در موش های پیر را توسط افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاهش داده است (۳۸).

این گزارش ها نتایج به دست آمده در این کار تحقیقاتی را تأیید می نماید؛ اما از آنجاکه الثوروپین دارای خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی می باشد، برای مشخص کردن مکانیسم دقیق اثر نوروپروتکتیو آن مطالعات مجزایی مورد نیاز است. به طور کلی تحقیق حاضر نشان می دهد که الثوروپین به صورت پیش درمانی قادر بوده است که کاهش زمان تأخیر در ورود به اتفاق تاریک ناشی از تزریق مرکزی کلشیسین را بهبود بخشدیده و به مقدار کنترل برساند؛ بنابراین اولئوروپین دارای اثرات مفیدی بر روی عملکرد مغزی می باشد و ممکن است در حفظ سلامت و درمان اختلالات ناشی از آلزایمر نقش داشته باشد.

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و شرکت دانا کاسیان و همچنین از خدمات و راهنمایی های آقای دکتر بهرام رسولیان تشکر و قدردانی می گردد.

اثرات حفاظتی در برابر اپوپیوز القاشه توسط ۶-هیدروکسی دوپامین در سلول های PC12 می باشد. این نتایج پیشنهاد می کند که اولئوروپین خصوصیات نوروپروتکتیو و احیا کننده نورونی دارد که می تواند برای درمان پارکینسون قابل توجه باشد (۳۲).

اثر مداخله گرانه (درمانی) اولئوروپین بر روی رادیکال های آزاد ممکن است از طریق ایجاد گروه های هیدروکسیل و خشند نمودن مستقیم رادیکال های آزاد اتفاق بیفتد. بسیاری از اثرات فارماکولوژیک اولئوروپین به فعالیت آنتی اکسیدانی آن نسبت داده شده است (۱۶). عمل تداخل اولئوروپین بهوسیله تأمین گروه های هیدروکسیل که مستقیماً رادیکال های آزاد را خشند و دفع می کند اعمال می شود. در این تحقیق، مقایسه نتایج بین گروه های کلشیسین- سالین و کلشیسین- اولئوروپین در زمان تأخیر ورود به قسمت تاریک و مدت زمان سپری شده در قسمت تاریک ۲۴ ساعت پس از آموزش نشان داد که اختلاف معنی داری وجود دارد و دوز های ۱۰mg/kg و ۲۰mg/kg اولئوروپین اختلال در حافظه حاصل از کلشیسین را بهبود بخشدیده و زمان تأخیر را در تست احترازی غیرفعال افزایش داده است. این نتایج اثرات مثبت اولئوروپین بر روند یادگیری اجتنابی غیرفعال تخریب شده توسط کلشیسین را تأیید می کنند؛ همچنین در مطالعه قبلی نشان داده شد که اولئوروپین استرس اکسیداتیو ناشی از کلشیسین را در مدل شبکه آلزایمری در موش را کاهش می دهد (۲۰). نقش اولئوروپین به عنوان یک ترکیب نوروپروتکتیو همچنین در مدل های *in vitro* آلزایمر مطالعه شده است. شاخص های نوروپاتولوژیکی بیماری آلزایمر شامل تجمع پلاک های نوروتیک خارج سلولی (که از پتیدهای آمیلوئید β تشکیل می شود) و کلاف های نورو فیریلاری داخل سلولی (که ترکیب اصلی آن پروتئین τ هیپرفسفیریله شده است) می باشد (۳۳). پتیدهای آمیلوئید β تمايل به تجمع و تشکیل اولیگومرهای نورو توکسیک دارد که آبشاری از اتفاقات پاتولوژی را به راه می اندازد که منجر به مرگ سلولی

منابع

- Auld DS, Korneckook TJ, Bastianetto S, Quirion R. Alzheimer's disease and the basal forebrain cholinergic system: relations to β -amyloid peptides, cognition, and treatment strategies. *Progress in Neurobiology* 2002; 68: 209-245.
- Firuzi O, Praticò D. Coxibs and Alzheimer's disease: should they stay or should they go? *Ann Neurol* 2006; 59: 219-228.
- McIlroy S, Craig D. Neurobiology and genetics of behavioural syndromes of Alzheimer's disease. *Current Alzheimer Research* 2004; 1: 135-142.
- Markesberry WR. Oxidative stress hypothesis in Alzheimer's disease. *Free Radical Biology and Medicine* 1997; 23: 134-147.
- Whitehouse PJ, Price DL, Struble RG, Clark AW, Coyle JT, Delon MR. Alzheimer's disease and senile dementia: Loss of neurons in the basal forebrain. *Science* 1982; 215: 1237-1239.
- Kumar A, Seghal N, Naidu PS, Padi SS, Goyal R. Colchicines-induced neurotoxicity as an animal model of sporadic dementia of Alzheimer's type. *Pharmacological Reports* 2007; 59: 274-283.
- Nakayama T, Sawada T. Involvement of microtubule integrity in memory impairment caused by colchicine. *Pharmacology Biochemistry & Behavior* 2002; 71:119-138.
- Veerendra Kumar MH, Gupta YK. Intracerebroventricular administration of colchicine produces cognitive impairment associated with oxidative stress in rats. *Pharmacology Biochemistry & Behavior* 2002; 73: 565-571.
- Emerich DF, Walsh TJ. Cholinergic cell loss and cognitive impairments following intraventricular or intradentate injection of colchicine. *Brain Research* 1990; 517: 157-167.
- Porkhodadad S, Karami M, Jalali nadoushan MR. Positive effect of nitric oxide on morphine-induced place conditioning in wistar rats treated by colchicine intra-hippocampal CA1. *Journal of Clinical Toxicology* 2011.
- Scarmeas N, Stern Y, Tang MX, Mayeux R, Luchsinger JA. Mediterranean diet and risk for Alzheimer's disease. *Annals of Neurology* 2006; 59(6):912-21.
- Farr SA, Price TO, Dominguez LJ, Motisi A, Saiano F, Niehoff ML, et al. Extra virgin olive oil improves learning and memory in SAMP8 mice. *The Journal of Alzheimer's Disease* 2012; 1: 81-92.
- Pitzozzi V, Jacomelli M, Zaid M, Luceri C, Bigagli E, Lodovici M, et al. Effects of dietary extra-virgin olive oil on behaviour and brain biochemical parameters in ageing rats. *British Journal of Nutrition* 2010; 11: 1674-1683.
- Valls-Pedret C, Lamuela-Raventos RM, Medina-Remon A, Quintana M, Corella D, Pinto X, et al. Polyphenol-rich foods in the Mediterranean diet are associated with better cognitive function in elderly subjects at high cardiovascular risk. *Journal of Alzheimer's Disease* 2012; 4: 773-782.
- Pitt J, Roth W, Lacor P, Smith AB, Blankenship M, Velasco P, et al. Alzheimer's-associated Abeta oligomers show altered structure, immunoreactivity and synaptotoxicity with low doses of oleocanthal. *Toxicology and Applied Pharmacology* 2009; 2: 189-197.
- Omar SH. Oleuropein in olive and its pharmacological effects. *Scientia Pharmaceutica* 2010; 78(2):133-54.
- Diomedè L, Rigacci S, Romeo M, Stefani M, Salmona M. Oleuropein aglycone protects transgenic C. elegans strains expressing A β 42 by reducing plaque load and motor deficit. *PLoS One* 2013; 8(3):e58893.
- Grossi C, Rigacci S, Ambrosini S, Ed Dami T, Luccarini I, Traini C, et al. The polyphenol oleuropein aglycone protects TgCRND8 mice against A β plaque pathology. *PLoS One* 2013; 8(8):e71702.
- Dekanski D, Selaković V, Piperski V, Radulović Ž, Korenić A, Radenović L. Protective effect of olive leaf extract on hippocampal injury induced by transient global cerebral ischemia and reperfusion in Mongolian gerbils. *Phytomedicine* 2011; 18:1137-1143.
- Pourkhodadad S, Alirezaei M, Moghaddasi M, Ahmadvand H, Karami M, Delfan B, et al. Neuroprotective effects of oleuropein against cognitive dysfunction induced by colchicine in hippocampal CA1 area in rats. *The Journal of Physiological Sciences* 2016; 1-9.
- Janahmadi Z, Nekooeian AA, Moaref AR, Emamghoreishi M. Oleuropein offers cardioprotection in rats with acute myocardial infarction. *Cardiovascular Toxicology* 2015;15(1):61-8.
- Izquierdo I, McGaugh JL. Behavioural pharmacology and its contribution to the molecular basis of memory consolidation. *Behavioural Pharmacology* 2000; 11(7-8):517-34.
- Izquierdo I, Medina JH. Memory formation the sequence of biochemical events in the hippocampus and its connection to activity in other brain structures. *Neurobiology of Learning and Memory* 1997; 68(3):285-316.
- Kumar A, Sehgal N, Kumar P, Padi SS, Naidu PS. Protective effect of quercetin against ICV colchicine-induced cognitive dysfunctions and oxidative damage in rats. *Phytotherapy Research* 2008; 22:1563-1569.
- Khalatbary AR, Ghaffari E, Mohammadnegad B. Protective Role of oleuropein against acute deltamethrin-induced neurotoxicity in Rat Brain. *Iranian Biomedical Journal* 2015;19(4):247-53.

26. Alirezai M, Dezfoolian O, Neamati S, Rashidipour M, Tanideh N, Kheradmand A. Oleuropein prevents ethanol-induced gastric ulcers via elevation of antioxidant enzyme activities in rats. *The Journal of Physiology and Biochemistry* 2012; 68(4):583-92.
27. Nakagawa Y, Nakamura S, Kaše Y, Noguchi T, Ishihara T. Colchicine lesions in the rat hippocampus mimic the alterations of several markers in Alzheimer's disease. *Brain Research* 1987; 408(1-2):57-64.
28. Yu Z, Cheng G, Hu B. Mechanism of colchicine impairment on learning and memory, and protective effect of CGP 36742 in mice. *Brain Research* 1997; 750: 53-58.
29. Dufourny L, Leroy D, Warembourg M. Differential effects of colchicine on the induction of nitric oxide synthase in neurons containing progesterone receptors of the guinea pig hypothalamus. *The Brain Research Bulletin* 2000; 52:435-443.
30. Bondy SC. The relation of oxidative stress and hyperexcitation to neurological disease. *Proceedings of The Society for Experimental Biology and Medicine* 1995; 208: 337-345.
31. Wallis RA, Panizzon KL, Henry D, Wasterlain CG. Neuroprotection against nitric oxide injury with inhibitors of ADP-ribosylation. *Neuroreport* 1993; 5:245-248.
32. Pasban-Aliabadi H, Esmaeili-Mahani S, Sheibani V, Abbasnejad M, Mehdizadeh A, Yaghoobi MM. Inhibition of 6-hydroxydopamine-induced PC12 cell apoptosis by olive (*Olea europaea* L.) leaf extract is performed by its main component oleuropein. *Rejuvenation Research* 2013; 16(2):134-42.
33. Lin MT, Beal MF. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases. *Nature* 2006; 443(7113):787-95.
34. Dierssen M. Down syndrome: the brain in trisomic mode. *Nature Reviews Neuroscience* 2012; 13(12):844-58.
35. Daccache A, Lion C, Sibille N, Gerard M, Slomiany C, Lippens G, et al. Oleuropein and derivatives from olives as Tau aggregation inhibitors. *Neurochemistry International* 2011; 58(6):700-7.
36. Rigacci S, Guidotti V, Bucciantini M, Nichino D, Relini A, Berti A, et al. A β (1-42) aggregates into non-toxic amyloid assemblies in the presence of the natural polyphenol oleuropeinaglycon. *Current Alzheimer Research* 2011;8(8):841-52.
37. Luccarini I, Ed Dami T, Grossi C, Rigacci S, Stefani M, Casamenti F. Oleuropein aglycone counteracts A β 42 toxicity in the rat brain. *Neuroscience Letters* 2014; 558:67-72.
38. Sarbishegi M, Mehraein F, Soleimani M. Antioxidant Role of Oleuropein on Midbrain and Dopaminergic Neurons of Substantia Nigra in Aged Rats. *Iranian Biomedical Journal* 2014; 18:16-22.

Daneshvar
Medicine

The effect of oleuropein on passive avoidance memory in colchicine-induced rat model of Alzheimer's disease

Soheila Pourkhodadad^{1*}, Mehrnoosh Moghadasi Jahromi¹, Zahra Khanipour¹, Manizheh Karami²

1. Razi Herbal Medicines Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.
2. Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran.

*Corresponding author e-mail: s.porkhodadad@yahoo.com

Abstract

Background and Objective: Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease along with learning and memory disorders. Oleuropein is a phenolic compound with antioxidant and neuroprotective properties that reduces oxidative stress and improves cognitive function. The purpose of this study was to investigate the effect of oleuropein pretreatment on the colchicine- induced cognitive dysfunction using passive avoidance learning.

Materials and Methods: Adult male rats (200-250 g) were used in this study. Oleuropein (10 and 20 mg/kg, *p.o.*) was used for a period of 10 days prior to colchicine administration. On the tenth day of administration, the rats were bilaterally cannulated at the CA1 area. Colchicine (15 µg/rat) was bilaterally administered into CA1 area of the hippocampus. After one week of recovery, then their learning and memory levels were investigated through passive avoidance learning test. For assessment of retention memory after 24 hours, the interval between the placement in the light chamber and the entry into the dark chamber was measured as step through latency. Furthermore, the total time spent in the dark chamber was also measured.

Results: Administration of colchicine reduced the step through latency and augmented the time spent in the dark chamber. Administration of oleuropein (10 and 20 mg/kg) prior to colchicine (15 µg/rat) improved colchicine-induced cognitive impairment.

Conclusion: The results showed that oral administration of oleuropein improves learning and memory impairment induced by colchicine.

Keywords: Oleuropein, Alzheimer's disease, Colchicine, Passive avoidance memory, Hippocampus.

Scientific-Research
Journal of Shahed
University
23rd Year, No.124
August- September,
2016

Received: 04/07/2016
Last revised: 14/08/2016
Accepted: 23/08/2016