

دانشور

پژوهشگر

تأثیر فراورده گیاهی SIM5 بر سلول‌های مونونوکلئر جداسده از مغز استخوان بیماران مالتیپل میلوما

نویسنده‌گان: رؤیا یارائی^{۱*}، محمد رضا جلالی ندوشن^۲، جلال الدین شمس^۳، شفایق تاجیک^۴

۱. دانشیار ایمونولوژی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
۲. استاد پاتولوژی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
۳. استادیار خون و انکولوژی، بیمارستان مصطفی خمینی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
۴. کارشناس ارشد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات آسم و آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

E-mail: ryaraee@yahoo.com

* نویسنده مسئول: رؤیا یارائی

چکیده

مقدمه و هدف: سلطان‌ها از مشکلات مهم جوامع هستند. در سال‌های اخیر فراورده‌های گیاهی برای یافتن اثرات ضدسرطانی و ایمونومدولاتوری مورد توجه قرار گرفته‌اند. SIM5 یک فراورده گیاهی است که اثرات افتراقی قابل توجهی بین سلول‌های سالم و رده‌های سرطانی داشته است؛ ولی تابه‌حال مستقیماً بر روی سلول‌های بیماران بررسی نشده است. در این مطالعه اثر SIM5 بر سلول‌های مونونوکلئر جداسده از مغز استخوان بیماران مالتیپل میلوما و افراد سالم بررسی گردید.

مواد و روش‌ها: باقیمانده نمونه‌های مغز استخوان بیماران (۷ نفر) و همچنین افرادی که حین بررسی مغز استخوان، نهایتاً مشکل پاتولوژیک خاصی در لکوستیت‌های آن‌ها تشخیص داده نشد (۷ نفر- گروه شاهد) در نظر گرفته شدند. سلول‌های تکه‌سته‌ای جدا شد و با SIM5 و فراکشن R10 مجاور گشت. پس از ۴۸ ساعت، توکسیسیته با تست LDH و فعالیت حیاتی با تست MTT سنجیده شدند.

نتایج: در بیماران مبتلا به مالتیپل میلوما، SIM5 موجب افزایش مرگ و میر سلول‌ها می‌شود؛ ولی در گروه شاهد غیرسرطانی چنین اثری ندارد. هم‌بستگی قوی بین توکسیسیته با تعداد پلاسماسل‌های مغز استخوان مشاهده شد. در نمونه‌های سرطانی کاهش فعالیت سلولی در حضور SIM5 دیده می‌شود؛ ولی در نمونه‌های گروه غیرسرطانی افزایش فعالیت روی می‌دهد.

نتیجه‌گیری: تأثیر SIM5 بر سلول‌های نمونه سالم و سرطانی متفاوت است و اثر توکسیک آن متمرکز بر سلول سرطانی است؛ لذا این فراورده برای مطالعه بیشتر بسیار بالرزش محسوب می‌شود.

واژگان کلیدی: SIM5، مغز استخوان، مالتیپل میلوما، تکثیر سلولی

دوماهنامه علمی-پژوهشی

دانشگاه شاهد

سال بیست و چهارم - شماره ۱۲۶

دی ۱۳۹۵

دریافت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

آخرین اصلاح‌ها: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

پذیرش: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

مقدمه

فراکشن آن به طور مستقیم بر سلول‌های به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان بررسی نشده است.

در این مطالعه اثر ضدسرطانی SIM5 و فراکشن R10 بر سلول‌های مونونوکلئر جاذب از مغز استخوان بیماران سرطانی و افراد گروه شاهد (غیرسرطانی) از نظر توکسیسیته و فعالیت سلولی بررسی شده است.

مواد و روش‌ها

افراد و نمونه‌ها

این مطالعه (مورد-شاهدی) بر روی سلول‌های جاذب از نمونه‌های تازه مغز استخوان بیماران که به بیمارستان مصطفی خمینی تهران مراجعه کرده و به دلایل بالینی و تشخیص پزشک متخصص نیازمند اخذ و بررسی نمونه مغز استخوان بودند، در دو گروه مالتیپل میلوما و گروه شاهد صورت گرفته است (مجوز کمیته اخلاق پزشکی به شماره ۴۱/۱۷۵۲۶۹ تصویب شده در دانشگاه شاهد).

گروه بیماران (مالتیپل میلوما): بیماران با علائمی شامل کم خونی و کاهش وزن و درد استخوانی بر اساس تشخیص و تأیید پزشک متخصص هماتولوژی-انکولوژی در این مطالعه قرار گرفتند و آزمایشات اولیه این بیماری (درصد پلاسماسل مغز استخوان بیش از ۱۰ درصد و درصد باند گامای الکتروفورز پروتئین سرم بیش از ۲۵ درصد) توسط متخصص پاتولوژی تأیید گردید. این افراد داروهای سرکوبگر ایمنی یا ضدسرطانی مصرف نکرده و سابقة نقص ایمنی نداشته‌اند و از بین نمونه‌های تازه تشخیص داده شده مالتیپل میلوما انتخاب شدند.

گروه شاهد (غیرسرطانی): افرادی که بعد از بررسی نمونه مغز استخوان، تشخیص سرطان در آن‌ها متفق و صرفاً علائمی شامل کم خونی و یا ترومبوسیتوپنی داشتند و داروهای سرکوبگر ایمنی مصرف نکرده‌اند و یا سابقه عفونت یا بیماری نقص ایمنی نداشته‌اند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.

سرطان که حاصل رشد بی‌رویه و بدخیم سلول‌های بدن است، از مضلات جدی جوامع امروزی است و در بین آن‌ها بدخیمی‌های خونی دسته بزرگی از بیماری‌های خونی هستند که اهمیت ویژه‌ای دارند (۱). مالتیپل میلوما از جمله این سرطان‌هاست که در آن سلول‌های سرطانی (پلاسماسل) در مغز استخوان بیماران تجمع می‌باشد. حضور بیش از اندازه و غیرعادی پلاسماسل‌ها در مغز استخوان و وجود پروتئین‌های منوکلونال در خون و ادرار بیماران از نشانه‌های این بیماری است (۲،۳). روش‌های درمانی هریک دارای مشکلات اجرایی و عوارض جانبی هستند که محدودیت‌هایی در درمان ایجاد می‌کند (۴-۷)؛ لذا یافتن داروهای جایگزین با اثرات جانبی کمتر و اثرات مفید بیشتر (به ویژه بر سیستم ایمنی) ضرورت پیدا می‌کند و گیاهان دارویی بستر مناسبی در این زمینه هستند.

مطالعات بسیاری درباره اثر دارویی گیاهان روی رده‌های سلولی سرطان ریه، پستان و... انجام گرفته است و نتایج آن‌ها اثرات سایتوکسیک داروهای گیاهی را نشان داده است (۸،۹). هرچند مطالعات مربوط به رده‌های سلولی مرحله بسیار مهمی در تحقیقات مربوط به یافتن فراورده‌های ضدسرطانی محسوب می‌شوند، ولی تأیید اثر آن‌ها بر سلول سرطانی که مستقیماً از بدن بیمار به دست آمده باشد، می‌تواند گامی به جلو باشد. یک فراورده گیاهی که جزء اصلی تشکیل‌دهنده آن عصاره مرزنگوش می‌باشد، به نام SIM5، اثرات درخور توجهی از نظر اثرات ضدسرطانی داشته است. بر اساس مطالعات قبلی ما این فراورده دارای اثر توکسیک قوی بر رده‌های سرطانی بوده و در همان شرایط اثر سمی بر روی سلول‌های نرمال ندارد (۱۰) که نشان‌دهنده قدرت افتراق خوبی بین سلول سرطانی و طبیعی است. از بین فراکشن‌های (بخش‌های مختلف ترکیبات از نظر وزن مولکولی تقریبی) آن، فراکشن R10 (مواد با وزن مولکولی بین ۱۰ تا ۳۰ کیلودالتون) بهترین اثر را نشان داده است (۱۱)؛ ولی تأثیر این فراورده و

وزن بین ۱۰ تا ۳۰ کیلو Dalton هستند و R10 نامیده می‌شوند.

پس از پایان مدت انکوباسیون ۴۸ ساعته، میکروپلیت سانتریفیوژ شد و مایع رویی حاصل از کشت سلول‌های تک‌هسته‌ای جمع‌آوری و تست MTT بر روی سلول‌ها انجام شد.

فعالیت حیاتی سلول با تست MTT

این تست برای سنجش میزان فعالیت سلولی که با فعالیت آنزیم‌ها از جمله آنزیم‌های میتوکندریایی مرتبط است، طراحی شده است. در شرایط مرگ و میر سلولی، مقدار آن کاهش و در شرایط فعال شدن یا تکثیر سلول مقدار آن افزایش می‌یابد. آنزیم‌های دهیدروژناز میتوکندریایی در سلول‌های زنده، MTT (dimethylthiazol 2 yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide (4,5-³SIM5) یا بدون آن‌ها، ۲۰ میکرومیکرولیتر از محلول MTT در غلظت نهایی ۰/۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر اضافه شده و پلیت‌ها به مدت ۴ ساعت انکوبه شدند. مایع رویی هر چاهک به‌آرامی تخلیه شد. کریستال‌های موجود در ته هر چاهک با ۱۰۰ میکرومیکرولیتر ایزوپروپانول آسیدی (N/۰۰۴) در اسید کلریدریک) حل شده و جذب نوری هر چاهک با دستگاه ELISA Reader ثبت گردید. درصد فعالیت بر اساس جذب مشاهده شده و فرمول زیر گزارش شده است:

$$\frac{\text{میانگین جذب نوری سلول‌های مراجه با SIM5}}{\text{میانگین جذب نوری سلول‌های بدون SIM5}} \times 100 = \text{درصد فعالیت}$$

سنجش میزان سایتوکسیسیته با تست سایتوکسیسیته (Lactate dehydrogenase) LDH لاكتات دهیدروژناز یا LDH یک آنزیم سیتوزولی پایدار است و از سلول‌های لیزشده رها می‌شود و بر اساس آن می‌توان درصد سایتوکسیسیته سلول‌ها را

مراحل کار برای هر فرد شرح داده شد، رضایت‌نامه برای هریک از مراجعه‌کنندگان تهیه شد و در صورت رضایت، از باقی‌مانده نمونه مغز استخوان آن‌ها برای انجام این پژوهش نیز استفاده شد. از بین کسانی که مورد بررسی قرار گرفتند، نهایتاً در هر گروه ۷ نفر واجد تمام معیارها بودند. داده‌های مربوط به شمارش سلول‌های خون محیطی (توسط دستگاه شمارش‌گر سلولی Kx-21 Sysmex, Japan) براساس اطلاعات مندرج در پرونده افراد گزارش شده است.

جداسازی سلول‌های مونونوکلئر و کشت

باقی‌مانده نمونه مغز استخوان (Bone Marrow) با ضدانعقاد هپارین مخلوط، در شرایط استریل و زیر هود لامینار به نسبت ۱:۲ با بافر PBS رقیق شد و به‌آرامی به لوله فالکون استریل محتوى ۱/۰۷۷ g/ml Ficoll-Paque (۰/۵ سی‌سی محلول فایکول) اضافه شد و با دور ۲۰۰۰ rpm به مدت ۲۰ دقیقه و دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ گردید. حلقة میانی حاوی سلول‌های تک‌هسته‌ای با سمپلر برداشت شد و به لوله فالکون استریل دیگر انتقال داده شد. مجدداً ۲ بار شست‌وشو انجام شد. به رسوب سلولی در آخرین مرحله شست‌وشو ۱ میلی‌لیتر محیط PRMI به همراه ۱۰ درصد FBS اضافه شد و شمارش سلول‌ها با لام نوبار همراه با تریپان بلو (۰/۰۶ درصد) انجام گرفت. سپس 10×10^4 سلول تک‌هسته‌ای در هر چاهک میکروپلیت ۹۶ خانه کشت داده شد. پنج چاهک فقط به سلول‌ها و محیط کشت اختصاص داده شد (کترل) و به چاهک‌های دیگر مقادیر منتخب ۵ SIM5 و ۱۰ R10 اضافه شد (پنج چاهک برای هر حالت). غلظت‌های مورد استفاده بر اساس مطالعات قبلی ۰/۴ و ۰/۲ میلی‌گرم در میلی‌لیتر SIM5 و ۰/۰۶ میلی‌گرم در میلی‌لیتر R10 هستند. برای تهیه فراکشن R10 از سیستم اولترافیلتراسیون آمیکون استفاده شد؛ به‌طوری‌که محلول حاوی SIM5 از چندین فیلتر با اندازه‌های ۱۰۰، ۵۰، ۳۰، ۱۰ و ۵ کیلو Daltonی عبور داده شد. مولکول‌هایی که از فیلتر ۳۰ رد شده، ولی بالای فیلتر ۱۰ باقی ماندند عمدهاً حاوی مولکول‌هایی با

پراکنده‌گی داده‌ها و آزمون T آنالیز شد و برای داده‌های نان‌پارامتریک از Fisher's test استفاده شد (نرم‌افزارهای Graph pad Prism و Excel). مبنای معنی‌دار بودن اختلافات $P < 0.05$ در نظر گرفته شده است.

نتایج

داده‌های دموگرافیک گروه بیمار و شاهد
از ۷ نفر افراد هر کدام از دو گروه مالتیپل میلوما و شاهد (غیرسرطانی) یک نفر زن و بقیه افراد مرد بودند؛ لذا از نظر جنسیت تفاوت آماری بین دو گروه وجود نداشت. میانگین سن افراد گروه شاهد 58 ± 9.7 و افراد مبتلا به مالتیپل میلوما 71 ± 7.0 سال بود و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود ($P < 0.02$) طیف سنی گروه کنترل ۴۳ تا ۷۳ و گروه بیمار ۵۸ تا ۷۹ بود.

میانگین تعداد گلbulهای سفید و قرمز خون محیطی

همان‌طور که در جدول ۱ دیده می‌شود، میانگین گلbulهای قرمز خون محیطی نیز در گروه بیمار کمتر از گروه کنترل (یا غیرسرطانی) است، این تفاوت از لحاظ آماری معنادار است ($P < 0.05$) (جدول ۱).

محاسبه کرد. محلول رویی سلول‌های کشت داده شده بعد از ۴۸ ساعت جمع‌آوری شده و ۵۰ میکرولیتر از مایع رویی هر چاهک و همچنین کنترل‌های لازم در پلیت ریخته شد و ۵۰ میکرولیتر نیز از محلول کیت LDH جای تاریک و در دمای اتاق انکوبه شد. بعد از این مدت زمان، میزان جذب نوری چاهک‌ها در طول موج ۴۹۲ نانومتر خوانده شد. در این تست باید چاهک‌های کنترل زمینه (فقط حاوی محیط کشت) و کنترل‌های پایین (تراوش خودبه‌خودی آنزیم از سلول بدون هیچ تیماری) و کنترل بالا (اضافه کردن تریتون ۱۰۰ به منظور لیز سلول و آزادشدن LDH به میزان حداقلی) نیز در نظر گرفته شوند. میانگین جذب نوری چاهک‌های کنترل زمینه (Background control) محاسبه شد و از میانگین جذب نوری بقیه کنترل‌ها (low and high control) و تست سلولی (Saito توکسیسیتی) در وضعیت‌های مختلف به دست آمد.

$$\% \text{ Cytotoxicity} = (\text{exp.value} - \text{low con} / \text{high con} - \text{low con}) \times 100$$

روشن تجزیه و تحلیل داده‌ها

نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری، میانگین و

جدول ۱. میانگین گلbulهای سفید و قرمز خون محیطی در افراد مورد مطالعه در گروه کنترل و بیماران مالتیپل میلوما


گلbul قرمز		گلbul سفید			
کمترین و بیشترین تعداد	تعداد در میلی‌متر مکعب (میانگین \pm انحراف معیار)	کمترین و بیشترین تعداد	تعداد در میلی‌متر مکعب (میانگین \pm انحراف معیار)	گروه کنترل	
$(3.0-5.1) \times 10^6$	$(4.0 \pm 0.5) \times 10^6$	$(4.0-11.9) \times 10^6$	$(9.07 \pm 2.9) \times 10^6$	گروه کنترل	
$(2.2-4.5) \times 10^6$	$(3.0 \pm 0.9) \times 10^6$	$(3.1-12.1) \times 10^6$	$(6.13 \pm 2.6) \times 10^6$	گروه	MM
	4.00×10^6		4.15×10^6		P Value

درصد پلاسماسیل‌ها و تعداد سلول‌های مونونوکلئر مغز استخوان

جدول ۲ میانگین تعداد سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان (BMMC) در هر میلی لیتر آسپیره مغز استخوان


تعداد در میلی لیتر	بیشترین کمترین تعداد	گروه شاهد گروه مالتیپل میلوما
$(11.8 \pm 2.5) \times 10^6$	$(8-15) \times 10^6$	
$(12 \pm 7.0) \times 10^6$	$(5-22) \times 10^6$	
۰.۶۴		P Value

فعالیت حیاتی (MTT) سلول‌ها تحت اثر SIM5 در گروه مالتیپل میلوما، درصد فعالیت حیاتی سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان (که حاوی پلاسماسال‌های سرطانی نیز هستند) در حالت مواجهه با $4/4$ میلی‌گرم در میلی‌لیتر SIM5 حدود 28 ± 28 درصد کاهش داشته به $15/1 \pm 3/2$ رسید (در مقایسه با سلول‌های همین بیماران بدون SIM5 یا کنترل) که نشان‌دهنده مرگ‌ومیر سلولی و ازنظر آماری نیز معنی‌دار است ($P<0.002$). در حضور $2/0$ میلی‌گرم در میلی‌لیتر SIM5 حدود 19 ± 19 درصد (که $P<0.01$)، در حضور R10 حدود 13 ± 13 درصد کاهش فعالیت مشاهده شد ($P<0.02$).



نحوه ۲. درصد فعالیت حیاتی، سلواها تحت اثر

درصد پلاسماسل‌ها در مغز استخوان در گروه کنترل بین ۲ تا ۵ درصد متغیر بود، درحالی‌که در تمامی افراد گروه بیمار بالاتر از ۱۰ درصد مشاهده گردید (بین ۱۰ تا ۱۵ درصد). میانگین درصد پلاسماسل‌ها در گروه کنترل 11.6 ± 1.1 درصد بوده (نمودار ۱) این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود ($P < 0.0001$).



نمودار ۱. میانگین درصد پلاسماسیل‌های مغز استخوان در دو گروه مالتیپل میلوما و گروه شاهد (غیرسرطانی).
لام نمونه مغز استخوان تهیه و رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین اوزین انجام شد و درصد پلاسماسیل‌ها تعیین گردید. اختلاف از لحاظ آماری معنادار است ($P<0.05$).

سلول‌های تک‌هسته‌ای از نمونه مغز استخوان (BMMC) گروه بیمار و شاهد جدا شد. حیات سلولی در هر دو گروه با رنگ‌آمیزی ترپیان بلو بررسی گردید که هیچ‌کدام کمتر از ۹۸ درصد نبود و سپس تعداد سلول‌ها شمارش و معاسبة تعداد سلول‌های مونونوکائی به‌ازای هر میلی‌لیتر آسپیره مغز استخوان انجام شد. تعداد سلول‌های تک‌هسته‌ای به‌دست‌آمده از هر میلی‌لیتر مغز استخوان، در دو گروه تفاوت معنادار از لحاظ آماری نداشت (جدول ۲).

باتوجه به اینکه در حضور SIM5، کاهش چشمگیر فعالیت یا به عبارتی مرگ و میر سلولی در سلول‌های افراد سرطانی و افزایش فعالیت حیاتی در گروه غیرسرطانی دیده می‌شود، تفاوت بین فعالیت حیاتی دو گروه بیش از ۴ درصد بوده، به طور واضح از نظر آماری معنادار است (P<0.000).

سایتوکسیسیته سلول‌ها (در تست LDH)
پس از کشت و انکوباسیون ۴۸ ساعتۀ سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان گروه بیمار و شاهد در حضور SIM5 و R10 و بدون هیچ کدام از این موارد (کنترل برای هر گروه)، سوپرناتانت جمع‌آوری و آنزیم LDH آزادشده در محیط کشت سنجیده شد، سپس طبق فرمول درصد سایتوکسیسیته محاسبه گردید.
میانگین جذب خوانده شده در کشت بدون SIM5 (کنترل بدون دارو) در بیماران مالتیپل میلوما و گروه شاهد (غیرسرطانی) به ترتیب 0.871 ± 0.056 و 0.888 ± 0.072 است که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند (جدول ۳).

سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان هر دو گروه جدا شدند و 15×10^4 سلول در هر چاهک پلیت ۹۶ خانه به مدت ۴۸ ساعت و به صورت تیمار با دارو و بدون دارو در چاهک‌های جداگانه کشت داده شد. میانگین این تست به صورت درصد فعالیت محاسبه شد. ستاره نشان‌دهنده معنادار بودن می‌باشد (P<0.05).

ولی همان‌طور که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، فعالیت حیاتی سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان در گروه غیربیمار وقتی در معرض 0.4 میلی‌گرم در میلی‌لیتر SIM5 قرار داشتند، نه تنها کاهش نداشت، بلکه افزایش داشته و میانگین آن به 117.2 ± 4.6 رسید که نسبت به سلول‌های بدون SIM5، افزایش فعالیت به میزان ۱۷ درصد را نشان می‌داد که از لحاظ آماری نیز معنی‌دار بود (P<0.000). در غلظت 0.2 میلی‌گرم در میلی‌لیتر SIM5 و R10 نیز نتایج مشابه دیده شد، به ترتیب افزایش فعالیت به میزان ۱۵ درصد (P<0.02) و ۱۲ درصد (P<0.04).

جدول ۳. تأثیر SIM5 بر رهاسازی LDH از سلول‌های مونوکلئر مغز استخوان در محیط کشت

PValue ^a	۰.۰۶ میلی‌گرم در میلی‌لیتر	۰.۱۶±۱.۱۰ (۰.۲۵۵)	PValue ^a	۰.۲ میلی‌گرم در میلی‌لیتر	PValue ^a	۰.۰۸ میلی‌گرم در میلی‌لیتر	بدون SIM5	بدون
(۰.۰۴۴)				۰.۲۳±۱.۰۲	(۰.۰۱۲)	۰.۰۸±۱.۰۴	۰.۰۷±۰.۸۹	مالتیپل میلوما
(۰.۰۰۷)		۰.۰۶±۰.۷۶ (۰.۰۱۴)		۰.۰۸±۰.۷۵	(۰.۰۰۲)	۰.۱۵±۰.۶۴	۰.۰۵±۰.۸۷	غیرسرطانی
	۰.۰۰۸			۰.۰۵۰		۰.۰۰۰	۰.۶۹۷	P Value ^b

^a مقایسه با کنترل همان گروه یعنی کشت سلول‌های فاقد SIM5
^b مقایسه دو گروه سرطانی و غیرسرطانی در شرایط مشابه کشت


از طرف دیگر، حضور SIM5 (۰.۰۴ میلی‌گرم در میلی‌لیتر) در سلول‌های افراد غیرسرطانی نه تنها موجب مرگ و میر سلولی نشده، بلکه این سلول‌ها نسبت به کنترل خود (یعنی همان سلول‌ها بدون SIM5)، مرگ و میر کمتری دارند که از نظر آماری معنی‌دار است ($P<0.002$). کاهش مرگ و میر بر اساس فرمول این تست باید به صورت منفی گزارش شود و لذا در این حالت $-38/1$ درصد مرگ سلولی رخ داده است (نمودار ۳). غلظت R10 و 0.04 میلی‌گرم در میلی‌لیتر SIM5 و فراکشن $0/2$ نیز اثر مشابهی داشته‌اند؛ یعنی به ترتیب $17/5$ - درصد ($P<0.007$) و 19 - درصد ($P<0.014$) مرگ و میر سلولی (نمودار ۳).

باتوجه به افزایش مرگ و میر در گروه سرطانی و کاهش آن در گروه غیرسرطانی توسط SIM5، تأثیر آن در دو گروه معکوس یکدیگر است، اختلاف آشکار و معنی‌دار از نظر آماری نشان می‌دهند (نمودار ۳)؛ در حالی که بدون SIM5 تفاوت معنی‌داری نداشتند.

باتوجه به اینکه سلول‌های سرطانی در این بیماران پلاسماسیل هستند، همبستگی بین درصد پلاسماسیل مغز استخوان و میزان توکسیسیته بررسی شد و مشاهده شد که همبستگی بسیار قوی (R=0.79, $P<0.0067$) بین این دو متغیر وجود دارد و با افزایش تعداد پلاسماسیل‌ها سایتوتوکسیسیته افزایش می‌یابد. همان‌طور که در نمودار ۴ دیده می‌شود، تا زمانی که درصد پلاسماسیل‌ها در محدوده طبیعی است، توکسیسیته هم دیده نمی‌شود؛ ولی در افراد مبتلا که دارای پلاسماسیل سرطانی فراوان هستند، توکسیسیته به میزان زیادی روی می‌دهد.


در گروه سرطانی، غلظت 0.04 میلی‌گرم در میلی‌لیتر SIM5 موجب افزایش آزادشدن LDH از سلول‌های مونونوکلئر مغز استخوان (حاوی پلاسماسیل‌های سرطانی) شده و میانگین جذب به 1045 ± 0.072 رسیده است (جدول ۳). این تفاوت طبق فرمول برابر $22/6$ درصد مرگ و میر سلولی یا سایتوتوکسیسیته است $P<0.012$ نسبت به کنترل بدون SIM5 (نمودار ۳).

Discriminative effect of SIM5 on Normal and Cancerous cells



نمودار ۳. درصد سایتوتوکسیسیته سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان تحت اثر SIM5

سلول‌ها از مغز استخوان افراد مبتلا به مالتیپل میلوما و افراد کنترل (غیرسرطانی) به تعداد $10^4 \times 10^4$ در هر چاهک پلیت ۹۶ خانه به مدت ۴۸ ساعت کشت داده شد، سپس مایع رویی هر چاهک جمع‌آوری شد. بر طبق کیت میزان مرگ سلولی در هر دو گروه (در غلظت 0.4 , 0.2 از SIM5 و 0.017 از R10) محاسبه و به صورت درصد توکسیسیته نسبت به سلول‌های فاقد دارو گزارش شد. ستاره نشان‌دهنده معناداربودن اختلاف می‌باشد $(P<0.05)$.



نمودار ۴. همبستگی بین درصد پلاسماسل مغز استخوان و میزان توکسیسیته در حضور ۰.۴ SIM5. محور افقی درصد پلاسماسل‌ها و محور عمودی میزان توکسیسیته را نشان می‌دهد

بحث و نتیجه‌گیری

نیز بررسی گردد. البته در آزمایشات متعدد قبلی نیز با استفاده از سلول‌های مونونوکلئر خون انسان یا SIM5 لنفوسيت‌های طحال موش نشان داده شده بود که برای سلول‌های طبیعی توکسیک نیست (۱۴) که در این مطالعه بررسی مجدد این نکته نیز روی سلول‌های مغز استخوان صورت گرفت.

در این مطالعه یک گروه شاهد در نظر گرفته شد که متشکل از افرادی بودند که به دلایل مختلف نیاز به بررسی بالینی مغز استخوان داشتند؛ ولی نهایتاً مشکل پاتولوژیک مرتبط با سرطان (یا نقص ایمنی یا سایر موارد مرتبط) دیده نشد و اکثرآ دچار کم خونی در سطح گلbul قرمز بودند که با توجه به جداسازی سلول‌های مونونوکلئر، به نظر نمی‌رسد تأثیری بر یافته‌های ما داشته باشد. دو گروه از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری نداشتند؛ ولی میانگین سن در گروه شاهد بیش از گروه سرطانی بود. البته هر دو گروه از افراد با سنین بالا تشکیل شده بود و از آنجاکه سطح پایه پارامترهای اندازه‌گیری شده مثل فعالیت حیاتی در تست MTT یا مرگ‌ومیر قبل از اضافه کردن دارو یا حتی سطح اولیه IL-2 در هیچ مورد بین دو گروه اختلاف معناداری نشان نداد، باعث می‌شود اختلاف سن را به عنوان عاملی که اثر جدی در این

مطالعات قبلی درمورد فراورده SIM5 اثرات ضدسرطانی آن را بر روی رده‌های سرطانی مختلف (از جمله رده‌های لنفوئید) نشان داده است و در عین حال اثر توکسیکی بر لنفوسيت‌ها یا سایر سلول‌های سالم دیده نشده است (۱۰). طبق مطالعات قبلی IC50 برای SIM5 حدود ۰/۴ میلی‌گرم در میلی‌لیتر بوده است (در این مطالعه از دو غلظت ۰/۴ و ۰/۲ استفاده شد) و یکی از مؤثرترین فراکشن‌های این فراورده (براساس مطالعات قبلی) که R10 است (ترکیبات با وزن مولکولی تقریبی بین ۱۰ تا ۳۰ کیلو Dalton) برای این مطالعه انتخاب شد (۱۴).

رده‌های سلولی سرطانی که در مطالعات اولیه مورد آزمایش قرار می‌گیرند با سلول‌های سرطانی موجود در بدن بیماران تفاوت‌هایی دارند و بعضًا ممکن است ماده‌ای که در شرایط *in vitro* بر رده سرطانی مؤثر است بر سلول سرطانی در بدن تأثیر کمتر یا متفاوتی داشته باشد؛ بهویژه که این سلول‌ها در ریزمحیط مناسب برای سلول‌های سرطانی در مغز استخوان بیماران رشد کرده‌اند (۱۵)؛ لذا اولین هدف این مطالعه این بود که تأثیر توکسیک SIM5 که تابه‌حال در رده‌های سرطانی مشاهده شده بر سلول سرطانی به دست آمده از بدن بیمار

نمی شود، بلکه افزایش فعالیت نیز روی می دهد (حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد افزایش فعالیت). از آنجاکه اکثریت قابل توجه سلول های مونونوکلئر مغز استخوان لنفوسیت و باقی مانده آن ها نیز معمولاً مونوسیت ها هستند، این نتیجه با یافته های قبلی مبنی بر قدرت تقویت سلول های ایمنی توسط این فراورده (که در موش انجام شده بود) سازگار است.

در مجموع می توان به این نکته اشاره کرد که این فراورده دارای اثرات توکسیک بر مجموعه حاوی سلول های سرطانی (که تازه از بدن بیماران خارج شده اند) بوده؛ ولی برای مجموعه فاقد سلول سرطانی یافته ها گام بزرگی در به کار گیری آن در بیماران سرطانی بر اساس مطالعات بیشتر خواهد بود.

سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی مصوب دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد می باشد. با تشکر از پرسنل بیمارستان مصطفی خمینی و کارشناس گروه ایمنی شناسی، آقای جمالی و سایر کسانی که در اجرای این طرح یاری رساندند.

منابع

- Urruticoechea A, Alemany R, Balart J, Villanueva A, Vinals F, Capella G. (2010) Recent advances in cancer therapy: an overview. Current Pharmaceutical Design. 16(1): 3-10.
- Heider U, Fleissner C, Zavrski I, Kaiser M, Hecht M, Jakob C, Sezer O. Bone markers in multiple myeloma. European Journal of Cancer. 2006; 42(11): 1544-53.
- Silvestris F, Lombardi L, De Matteo M, Bruno A, Dammacco F. Myeloma bone disease: pathogenetic mechanisms and clinical assessment. Leukocyte Research. 2007; 31(2): 129-38.
- Armirage JO, Longo DL. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. USA. McGraw-Hill companies, Inc. 2005: 641-655.
- Bierman J, Harris N, Armitage JO. Cecil textbook of medicine. 22nd ed. California. Elsevier Inc. 2004: 1174-1183.
- Nooka A, Lonial S. Sequential or combination therapy for multiple myeloma. Expert Reviews in Hematology. 2012; 5(5): 533-45.
- Slavin S, Morecki S, Weiss L, Or R. Immunotherapy of hematologic malignancies and metastatic solid tumors in experimental animals and man. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2003; 46(2): 139-63.

تست ها داشته باشد محسوب نکنیم.

در این مطالعه در نمونه سلول های مونونوکلئر مغز استخوان افراد مبتلا به مالتیپل میلوما که حاوی بخش عمدہ ای از سلول های سرطانی است، هم کاهش فعالیت بر اساس تست MTT و هم افزایش مرگ و میر بر اساس تست LDH مشاهده گردید که می تواند نشان دهنده اثر ضد سرطانی SIM5 باشد. مطالعات دیگری نیز از نمونه مغز استخوان بیماران برای بررسی اثر داروها استفاده کرده اند (۱۶). البته لازم به ذکر است که در مجموع سلول های مونونوکلئر مغز استخوان، سلول های سالم نیز حضور دارند؛ ولی همبستگی قوی ($r=0.79$) که بین میزان مرگ و میر و درصد پلاسماسل ها (سلول های سرطانی در مالتیپل میلوما) دیده شد، نشان می دهد که وجود توکسیسیته ارتباط قوی با میزان حضور سلول های سرطانی دارد و در شرایطی که درصد پلاسماسل ها طبیعی است، هیچ مرگ و میری مشاهده نمی شود. از طرف دیگر، SIM5 در افراد گروه شاهد هیچ تأثیر توکسیکی بر سلول های مونونوکلئر مغز استخوان در محیط کشت نداشته و حتی نسبت به کنترل خود مرگ و میر کمتری نیز داشتند.

نتایج فوق با تست MTT (مربوط به فعالیت حیاتی سلول) نیز تأیید شد و علاوه بر آن مشاهده گردید که در افراد گروه شاهد نه تنها کاهش فعالیت سلولی دیده

8. Ruan WJ, Lai MD, Zhou JG. Anticancer effects of chines herbal medicine, science or myth. *Journal of Zhejiang University Science*. 2006; 7(12): 1006-14.
9. Ranga RS. A herbal medicine for treatment of lung cancer. *Molecular Cell* 2005; 280 (1-2): 125-33.
10. Yaraee R, Ghazanfari T, Shams JAD, Esmaeili M, Jamali D. The Eeffect of herbal extract SIM5 on lymphoma cell lines and blood mononuclear cells. *Daneshvar Medicine* 2008; 15(73): 73-78.
11. Yaraee R, Kamalinejad M, Ghazanfari T, Eghtedardoost M. Discriminative Effect of SIM5 and its fractions on normal and cancerous lymphocytes. The 17th national & 5th International Conference of Biology of Iran. 2012.
12. Burton JD. The MTT assay to evaluate chemosensitivity. *Methods in Molecular Medicine*. 2005; 110: 69-78.
13. Morgan DML. Tetrazolium (MTT) Assay for Cellular Viability and Activity. *Methods in Molecular Medicine*. 1998; 79: 179-83.
14. Yaraee R., Kamalinejad M., Rajabian T. Eghtedardoost, M , Jamali D. Comparison of toxic effects of SIM5 and its fractions on normal resting, activated and cancerous cells. *daneshvarmed*. 2016; 24(125):1-12.
15. Kawano Y, Moschetta M, Manier S, Glavey S, Görgün GT, Roccaro AM, Anderson KC, Ghobrial IM. Targeting the bone marrow microenvironment in multiple myeloma. *Immunological Reviews*. 2015 Jan; 263(1): 160-72.
16. Rebersek K, Cernelc P, Podgornik H. Evaluation of multiple myeloma cell apoptosis in primary bone marrow samples. *Clinical laboratory*. 2013; 59(3-4): 389-95.

Daneshvar
Medicine

The effect of SIM5 on bone marrow-derived mononuclear cells of multiple myeloma patients

Roya Yaraee^{1*}, Mohammadreza Jalali Nadoushan², Jalaleddin Shams³,
Shaghayegh Tajik⁴

1. Associate Professor of Immunology, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
2. Professor of Pathology, Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor of Hematology and Oncology, Mostafa Khomeini Hospital, Shahed University, Tehran, Iran.
4. Asthma and Allergy Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

* Corresponding author e-mail: ryaraee@yahoo.com

Abstract

Background and Objective: Cancers are among the serious problems in communities. In recent years, herbal products have been very promising regarding their anti-tumor and immunomodulatory potentials. SIM5, a herbal preparation, has had good results in discriminating between cancerous cell lines and normal cells, but have not examined directly on patients' cells yet. In this study, bone marrow mononuclear cells from cancerous and non-cancerous samples were used to study the effects of SIM5.

Materials and Methods: Remained bone marrow samples of multiple myeloma patients (7 cases) and individuals who clinically needed bone marrow examination, but finally were diagnosed with no serious pathologic conditions in their leukocytes (7 cases) were considered as control group. Mononuclear cells were isolated and cultured with SIM5 and R10 fraction. After 48 h incubation, toxicity was assessed using LDH release test and vital activity with MTT test.

Results: Cell toxicity with SIM5 was observed only in multiple myeloma samples and not in control group samples. There was a strong correlation between toxicity and the number of plasma cells in bone marrow mononuclear cells. SIM5 induced a decrease in vital activity of cancerous cells but an increase in the normal bone marrow samples.

Conclusion: SIM5 has distinct effects on normal and cancerous cells, and its toxic effect is focused on the latter. Therefore, it possesses the properties of an ideal product to be studied more seriously.

Keywords: SIM5, Bone Marrow, Multiple myeloma, Cell proliferation.

Received: 22/10/2016

Last revised: 07/12/2016

Accepted: 14/12/2016